

Zusammenfassung - Empfehlungen

In einer Sortenprüfung bei Rhabarber am Versuchsbetrieb Queckbrunnerhof des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinpfalz zeigten sich deutliche Unterschiede in der Frühzeitigkeit, dem Ertrag und der Stängelqualität im ersten Erntejahr. Als Allroundsorte hat sich Sutton bewährt. Je nach Produktionsziel bieten sich Mira als sehr frühe Sorte oder besser gefärbte Sorten wie Holsteiner Blut oder Valentine als Ergänzung an.

Versuchsfrage u . - hintergrund

Der Rhabarberanbau hat in den letzten Jahren eine stetige Zunahme erfahren. Deshalb sollte ein Sortiment auf seine Anbaueignung überprüft werden.

Ergebnisse

1. Die Erträge variieren ohne Verfrühung im ersten Erntejahr deutlich und sollten für eine Sortenbewertung erst nach weiteren Standjahren herangezogen werden.
2. Als Standardsorte hat sich Sutton´s Seedless als qualitativ ansprechende Sorte mit teils gefärbten Stangen bewährt.
3. Die mit Abstand früheste Sorte Mira besitzt weitgehend grüne Stängel und wies in erheblichem Umfang Schosser auf. Als zweitschnellste Sorte zeigte sich Mikoot mit relativ guter Stangenqualität.
4. Die höchsten Erträge erzielte Goliath, eine gute Durchfärbung der Stangen wiesen Holsteiner Blut und Valentine auf.

Kritische Anmerkungen

Für den Feldanbau bleibt Sutton´s Seedless nach dem ersten Versuchsjahr sicher weiterhin die wichtige Standardsorte. Je nach Produktionsziel und Markt können sich Ergänzungssorten anbieten. Vor allem die Eignung zur Verfrühung unter Folie ist ein weiteres wichtiges Sortenmerkmal, das im nächsten Jahr bearbeitet werden soll.

Tabelle 1: Ergebnisse Sortenprüfung Rhabarber
Pflanzung März, April 2002

Ertrag		Frühzeitigkeit			Schosser	Qualität		
Ertrag (kg/10 Pfl.)	g/ Stange	Ernte- beginn	Ernte- ende	Beginn Blütenbildung (20% d. Pflanzen)	Farbe Stängel (1 grün - 5 rot)	Durchfär- bung (1-9)	Bemerkungen	
Mira	39,2	188	23.4	20.5	3.4	2	3	schnellste Sorte, frühes Schossen
Mikoot	23,5	209	23.4	20.5	22.4	3,5	4	Zweitschnellste Sor- te
Viktoria	26,9	197	24.4	20.5	12.4	2	3	starke Schosserbil- dung
Frambozen Rood	25,1	171	5.5	27.5	24.4	3,5	3,5	stark gerippter Stän- gel
Sutton's Seedless	18,6	179	5.5	27.5	Keine	3	4	Standard
Valentine	15,2	167	5.5	27.5	Keine	4	7	Stängel z.T. etwas kurz
Holsteiner Blut	17,9	245	2.5	20.5	24.4	6	7	
Goliath	41,0	363	2.5	20.5	Vereinzelt	2	2	Hohes Stangenge- wicht
Stockbridge Arrow	8,1	198	5.5	27.5	Vereinzelt	4	3	2003 noch schwache Pflanze
Verbeek's Goliat Selektion	27,6	340	2.5	20.5	Vereinzelt	2	2	Schöne gerade Stängel
The Sutton, regionale Her- kunft	22,7	239	2.5	20.5	Keine	3,5	5	Standard